

Nombre Comercial: DRAGO

Ingrediente activo: Cipermetrina

Concentración: 250 gr de Cipermetrina por litro.

Formulación: Concentrado emulsionable (EC).

Grupo químico: Piretroides.

Descripción: **Drago** es un insecticida piretroide de amplio espectro recomendado para el control de las principales plagas masticadoras, chupadoras y raspadoras en los cultivos de cereales y hortalizas. Es una cipermetrina **high-cis**, que es la mezcla mejorada de la cipermetrina regular contiene ochenta por ciento de isómeros cis, veinte por ciento de isómeros trans. Lo que la hace bastante efectiva en el control de insectos. Además que se requiere mucho menos cantidad de cipermetrina en comparación con la cipermetrina regular,

Modo de acción: **Drago** actúa por contacto e ingestión, con efecto fulminante (Knock down).


Mecanismo de acción: El sistema nervioso es el sitio primario de acción, mediante el desequilibrio del transporte de iones en las membranas de las células nerviosas a nivel del axón. Los piretroides ocasionan una prolongación en el tiempo de apertura de los canales de sodio de la membrana de la célula nerviosa provocando un permanente estado de excitación. Esto provoca finalmente la muerte del insecto.

Modo de empleo: Las aplicaciones de **Drago** deberá iniciarse cuando se observan los primeros daños económicos, asegurando de esa manera un excelente control y un mayor rendimiento. **Drago** puede aplicarse con cualquier equipo de aplicación terrestre y aérea. En aplicaciones con asperjadoras de espalda úsese volúmenes de agua entre 200 - 400 lt/ha. Aplicaciones con tractor deben hacerse con volúmenes de agua de 100 - 200 lt/ha., y aplicaciones aéreas deben realizarse con volúmenes de agua de 60 - 80 lt/ha.

USOS Y DOSIS

Cultivo	Plaga	Dosis (cc/ha)
Maíz	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>) Gusano del jojoto (<i>Heliothis sp</i>)	250 a 400
Arroz	Gusano Cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>) Chinche Vaneador (<i>Oebalus sp</i>)	200 a 250 250 a 300
Sorgo	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	250 a 400
	Mosquita del ovario (<i>Contarinia sorghicola</i>)	100 a 150
Algodón	Gusano alabama (<i>Alabama argillacea</i>) Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>) Falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>) Gusano sacadodes (<i>Sacadodes pyralis</i>)	250 a 400
Hortalizas	Minador de la hoja (<i>Liriomyza sativae</i>) Palomilla del repollo (<i>Plutella sp</i>) Gusano del repollo (<i>Pieris brassicae</i>)	300 a 350
Girasol	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	250 a 400
	Falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>)	300 a 350
Ajonjolí	Gusano de la hoja (<i>Antigastra catalaunalis</i>)	300 a 350

También se recomienda su uso en el control de Piojo Negro (*Thrips tabaci*) y Minador de la hoja (*Liriomyza trifolii*) en cebolla (300 – 350 cc/ha) y en madera para el control de comejenes (12,5 cc/10 litros de agua)



Compatibilidad y Fitotoxicidad: DRAGO® es compatible con la mayoría de los agroquímicos. En caso de dudas se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de preparar la mezcla definitiva. **Drago** puede presentar incompatibilidad con productos alcalinos o sulfurados. A las dosis recomendada **Drago** no presenta fitotoxicidad en los cultivos.

Presentaciones: Envases de 250 cc y de 1 litro.

Categoría Toxicológica: Moderadamente tóxico.

Registro N°: INSAI20210021011209419

